



THE VOICE OF EUROPEAN HUNTERS

FACE  
Rue Belliard 205  
B-1040 Brussels

+ 32 (0)2 732 6900  
info@face.eu  
www.face.eu

## Rekomendacje FACE dla myśliwych dotyczące przygotowań do i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w terenie

### Myśliwi: przed wystąpieniem ASF

#### Baza wiedzy:

- Należy uzyskać informacje od krajowych związków łowieckich i/lub stosownych organów władzy na temat:
  - objawów klinicznych lub innych sposobów monitorowania ASF u dzików,
  - zarządzania populacją w celu zapobiegania ASF,
  - środków bezpieczeństwa biologicznego, patrz także [poradnik Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt \(OIE\)](#), rozdziały 4 i 5.

#### Komunikaty:

- Należy dopilnować, aby wszystkie zainteresowane strony na danym obszarze łowieckim były poinformowane o chorobie oraz należy współpracować z nimi w realizacji stosownych działań:
  - leśnicy: w związku z ASF istnieje możliwość wprowadzenia zakazu polowań na obszarach, gdzie występuje potrzeba zarządzania populacją zwierząt kopytnych (w związku z tym zakazem mogą powiększyć się szkody wyrządzone przez gatunki),
  - rolnicy: konieczność zastosowania środków bezpieczeństwa biologicznego.
  - turyści: należy poinformować turystów o ryzyku rozprzestrzeniania się ASF.

#### Populacje dzików:

- Należy podjąć próby monitorowania populacji, współpracując z innymi zainteresowanymi stronami i/lub władzami.
  - skontaktować się z odpowiednimi organami w przypadku podejrzenia, że zwierzęta zostały zarażone wirusem ASF.
- Należy wdrożyć strategię zgodne z krajowymi i międzynarodowymi rekomendacjami zmniejszania populacji dzików.

#### Bezpieczeństwo biologiczne:

- Gdy doszło do kontaktu z dzikiem należy podjąć niezbędne środki ostrożności związane z bezpieczeństwem biologicznym:
  - nie odwiedzać gospodarstw hodujących świnie domowe przez 48 godzin.
  - regularnie czyścić miejsce i wszelkie narzędzia stosowane do oprzątkowania zwierząt (z wykorzystaniem zatwierdzonych środków czyszczących).
- Zachować niezbędne środki bezpieczeństwa biologicznego w drodze do i z miejsc występowania wirusa:
  - nie przynosić ze sobą produktów pochodzących od dzików (np. mięsa, orzęza),

- zdezynfekować wszystkie materiały, które miały kontakt z dzikiem (z wykorzystaniem zatwierdzonych środków czyszczących).
- Przystosować działania łowieckie/obwód łowiecki do wystąpienia wirusa ASF
  - przygotować do wdrożenia wytyczne/zasady wydane przez krajowy związek łowiecki/stosowne władze,
  - sprawdzić stan posiadania niezbędnych narzędzi do wdrożenia środków bezpieczeństwa biologicznego.

## **Myśliwi: po wystąpieniu ASF**

### Wiedza:

- Należy dbać o bieżące aktualizacje informacji dotyczących ASF, dzielić się z innymi własnymi doświadczeniami oraz wnioskami, szczególnie z krajowym związkiem łowieckim/ stosowymi władzami.

### Komunikaty:

- Należy poinformować wszystkie zainteresowane strony o niebezpieczeństwach związanych z ASF oraz zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.
- Należy informować o środkach, które aktualnie są wdrażane i dążyć do zawiązywania współpracy przy wzmacnianiu ich efektów.

### Populacja dzika:

- Należy wdrożyć środki mające na celu zmniejszenie populacji dzików na terenach wolnych od wirusa ASF oraz, gdzie możliwe, wzmacniać inne działania na terenach już zajętych przez wirus ASF:
  - dowiedzieć się u stosownych władz, jakie środki muszą być wdrożone.
- Ważne jest prowadzenie ciągłego monitoringu, a usuwanie padliny uważa się za niezbędne, ponieważ ASF utrzymuje się w środowisku przez długi czas:
  - zaproponować stosownym władzom wsparcie w przeprowadzaniu tych zadań.

### Bezpieczeństwo biologiczne:

- Należy upewnić się, że posiadane umiejętności oraz wyposażenie są gotowe do wykorzystania do wdrożenia środków bezpieczeństwa biologicznego.
- Podczas polowań lub przy podejmowaniu wszelkich innych czynności, które mogłyby zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ASF, należy zastosować wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa biologicznego, a także zwrócić na to uwagę wszystkim zaangażowanym stronom.